

Messieurs,

opération du bec de lièvre.

Les succès que j'ai obtenus par la méthode
d'opérer les bcs de lièvre, ~~de la méthode~~
exigent que je vous en fasse hommage. ~~car si je~~
~~vous rendais bien en agissant, j'ajouterais quelques~~
~~réflexions fruit de mon expérience particulière,~~
je me flatte que vous ne les trouverez pas mauvais :
vous êtes assez riche de votre propre fond, pour
souffrir que sur un des Sujets que vous avez
traités, quelqu'autre passage encore et
glanne après vous.



Je dois dire un mot des circonstances dans
lesquelles j'eus l'occasion de faire mes opérations
premières : cela est d'autant plus indispensable
qu'elles fournissent de nouvelles preuves de
l'infidélité de l'ancienne méthode, et que
de son usage il résulte tous les inconvénients
qui ~~vous~~ nous font combattre.

Ju élevé d'un Hôtel-Dieu de Paris établi dans
un village auprès du mien se chargea d'opérer
deux bcs de lièvre au je suis résident, le premier
Sujet était un enfant de sept semaines
appartenant au nommé Berthelot concierge

ARC 53

n° 74

Du priciu de la vie, se fus jure de me trouver
à l'opération, L'appareil m'en surprit
beaucoup et je m'attendis bien que l'ancienne
méthode allait encore une fois se trouver en
désus. malgré mon pronostic qui je ne
dissimulai pas, le Chirurgien se mit à opérer.
L'enfant placé entre les bras de la sage femme,
le père de l'opérateur lui tenait la tête, celui
- ci par six à sept coups de ciseaux, rafraichit
ou plutôt cicatrisa les bords de la division de la
levre. Il passa une épinglette à travers la
partie inférieure de la plaie, et une autre
à travers la partie supérieure. il fit la
suture entortillée, plaça sur la plaie une
petite compresse trempée dans l'eau vulnéraire.
Il finit en appliquant une bande de 15 jours
de long et de 9 lignes de large qui se fixa à l'une
et à l'autre tempe avec des épingles.

Le second sujet sur lequel il fut opéré était
le fils âgé de onze ans du nommé Pierre Cochon
Vigneron. Le chirurgien se comporta de la même
manière qu'il avait précédemment fait, à la
différence seulement que pour obtenir la
réunion, il fit usage de trois épingles au lieu
de deux.

Les opérations furent faites à un jour
d'intervalle l'une de l'autre. à peine le
chirurgien était-il sorti de la maison où il
opérait la première, que le bandage remonta
sur le front de l'enfant, et laissa échapper la

Compresses. La Page femme encore présente le
rétabli du union quelle put. Deux jours après
l'épingle inférieure d'hier ou tôt de la lèvre inférieure
quittant. Le Chirurgien en refaisa une autre plus
haute, qui n'empêcha pas la seconde de se détacher
le troisième jour, comme la première avait fait.
Le Cinquième jour la nouvelle en fit autant;
en sorte que les points irritèrent le bord de la
place quittée, et firent beaucoup souffrir
l'enfant. Il n'en fut embarrassé que le
huitième jour à cause d'une absence de trois jours
du chirurgien. Alors peu satisfait de son
ouvrage, celui-ci m'invita à le reparer si je
pouvais. Je ne doutai point de la réussite
malgré l'extrême jeunesse du sujet, en faisant
usage de votre méthode. J'opérai avec le
Bistouri, je fis la ressection que vous indiquiez,
j'emportai les déchirures, que les épingles avaient
faites, je pratiquai un point de suture près
des bords vermeils de la lèvre, en aide avec
le noied de Chirurgien. J'observai de laisser entre
la division l'espace nécessaire pour loger
l'inflammation qui survient toujours dans les
vingt-quatre heures. Par cette précaution la
suture ne pouvait faire aucune pression sur
les bords de la plaie, je plaçai mon appareil
tel que vous le prescrivez, à peine eu-je
fini que l'enfant s'endormit et ne se
réveilla que vingt-quatre heures après. Le



quatrième jour j'otai le point de suture; la
réunion était exacte. Je substituai un emplâtre
de Nuremberg à celui de Betoine dont j'avais
d'abord fait usage. Le 8^e j'otai le huitième jour,
l'enfant était parfaitement guéri. Il a
tâché et dormi pendant sa guérison, comme
s'il n'avait eu aucun mal.

L'opération sur l'enfant de onze ans aurait
pû à raison de son âge ou plutôt de sa raison,
être moins malheureuse que celle sur l'enfant de
sept semaines; elle n'eut néanmoins pas plus de
suite. Du quatre au cinq même jour l'épingle
inférieure quitta un des bords de la plaie en le
déchirant, et le malade l'ota lui-même. Le
sixième jour les deux autres étant restées aussi à
quitter furent retirées par le Chirurgien. La plaie
n'était qu'à moitié réunie; on m'appella pour
remédier à cette imperfection s'il était possible.
Je trouvai même existante la supuration que
l'effet des ciseaux avait occasionné; j'en profitai
pour obtenir la réunion, par le seul rapprochement
des bords de la plaie, que mon bandage maintint.
Je ne fis usage que de l'emplâtre de Nuremberg;
au bout de six jours le malade se trouva
complètement guéri.

Telles sont les circonstances dans lesquelles votre
méthode, Monsieur, me procura une guérison
sûre: ceux que j'obtins encore depuis me confirmèrent
sa supériorité sur celle des anciens. elle lui est
à tous égards préférable: d'abord en ce qu'elle

moyen l'opération se peut se faire avec une égale
Certitude de succès sur l'enfant à la manuelle
que sur celui de l'âge exigé par le opérateur selon
l'ancienne méthode; ensuite en ce que le sujet d
parvenu à ce dernier âge, elle donne la facilité
d'obtenir la résection sans même pratiquer de points
de suture pourvu qu'il y ait un point d'appui;
Enfin en ce qu'elle rend l'opération indubitable
sur quelques bords de lèvre qui se puisse être.

Il en distingue en effet de plusieurs sortes
et d'une avec plus ou moins facile: le simple
proprement dit, le simple compliqué de la
division de la voûte du palais dans toute son étendue,
et le composé ou double qui peut être compliqué
aussi de l'écartement des os de la voûte du palais.

Le simple, comme on le voit, ne consiste qu'en une division
à la moitié ou aux trois quarts de la largeur de la
lèvre, il se trouve rarement adhérence avec
la mâchoire; seulement quelques fois on de
bords de la division est plus court que l'autre, ou les
angles sont plus arrondies, ce qui alors oblige plus
ou moins à couper et fait toute la difficulté de
l'opération dans cette espèce.

Dans le simple compliqué de la division de
la voûte du palais, la fente traverse la lèvre sur
toute sa largeur jusqu'à la narine;
Les bords de la plaie sont toujours adhérents aux
bords de la division de l'os maxillaire, et par
l'espace plus ou moins grand qui résulte de



L'écartement, cette épreuve est plus difficile pour
L'opération.

Le composé ou double lors qu'il n'est pas
composé de la division de la maxillaire et du palais,
ne fait approuver que par le que deux béc-de lièvre
s'insèrent; on peut les ouvrir en deux temps à quinze
jours l'un de l'autre, et avec autant de facilité
qu'il n'y en avait qu'un. Il en est autrement
quand ce composé est composé d'un écartement;
il participe, en ce cas, du simple composé, et
L'opération est à peu près de même sorte.

J'ai dit que par votre méthode, Monsieur,
on pouvait aussi sûrement ouvrir l'uvule d'un enfant
à la mamelle que d'un sujet plus avancé;
J'ajoute que je ne ferais même force de réussir dans
les premiers jours de la naissance, si pour soustraire
la vie à un enfant et lui procurer la facilité de
téter, il était indispensable de le soumettre à
L'opération.

Je crois que jusqu'à l'âge de raison, il faut dans
tous les cas employer les points de suture.
Lorsque la ressection des bords de la division est
faite, on en fait continue de crin et la rétraction
de la terre est considérable: J'assure par ce
point de suture le rapprochement des bords que
mon aide ouvre en poussant chaque joue vers la
division. Il est peu sensible et n'augmente pas
l'inflammation de la plaie: quand on voit le
fil se troubler, on le change par un autre, si
l'on a l'attention de ne le comprimer dans —

à l'aise du point que d'un ligne d'épaisseur de chaque
Bord.

Je ne fais point usage d'emplâtre agglutinatif; je
le croi plus nuisible qu'utile, en sa qu'il forme des
ruides quand on applique le bandage et qu'il
durcit par humidité; une compresse chargée de
Baume Blanc du perou tiend la place mollement;
c'est pour quoi elle m'a paru préférable dans les
premier jours de l'opération.

Le bandage est le qu'il y a de plus important;
est de lui que l'on obtient le succès lorsqu'on l'a
appliqué avec méthode et précaution. Je me suis
appercu que mis sur une tête nue, il étoit
susceptible de se déranger pour peu que l'enfant
frota; que même les épingles ne le ruidait pas
toujours solide. Je supplée à ces inconvénients par
l'usage d'un bonnet piqué semblable à celui
que nos paysannes mettent pour leurs coiffes. Il
faut qu'il soit juste et qu'il enveloppe bien la tête.
Je le maintiens par un band d'un genre de targe
cousue d'un angle à l'autre du bonnet en passant
sous le menton; Il devient aussi solide que la
peau du crâne. Je place la première la bande
qui attachée du front à la nuque passe par dessus
la tête; il est nécessaire qu'elle soit plus grande
que si elle n'étoit mise qu'après le bandage fini,
afin qu'après qu'il a passé dans un révolution,
elle se retire dans les anses faites lorsqu'en
la replaçant jela relève et attache sur la tête.



à mesure que j'emploie le bandage, j'en fixe
chaque révolution au bonnet avec des épingles.
les mouvements et les cris de l'enfant ne font
rien déranger, si l'on a eu l'attention de composer
la bande d'une toile non sujette à l'allongement.
J'en ai la preuve par le succès d'une opération
sur un enfant de treize mois qui avait la coqueluche.
Je puis assurer qu'il a été singulièrement compté.

Le Bandage vis-à-vis la playe est sujet à se durcir;
je l'humecte, aux enfans à la mammelle avec de
l'eau et du vin tiède. à l'égard de ceux qui
boivent, lors que je veux opérer l'humectation,
je leur fais boire à plein verre et j'ete force en
le lever; par ce moyen la boisson contenue dans
le verre s'étend jusqu'au nez et produit l'effet
attendu, sans contraindre l'enfant qui résisterait
à laisser passer le bandage.

Voici quelques autres précautions dont j'use, et
le régime que je y résis. La veille de l'opération
je fais coucher l'enfant plus tard qu'à son ordinaire,
et le lendemain j'ete fais lever plus matin; de
cette sorte son sommeil étant interrompu je m'en
assure un plus prompt retour. on lui donne à jeuner
la digestion faite j'ete l'opère; la douleur n'a pas
fluctué vers qu'il s'endort, je le fais coucher sur le
côté, et quand il ne dort pas, on le tient en
l'amusant qui la gêne du bandage le fasse
crier le moins possible. S'il est à la mammelle
on lui donne à têter à l'ordinaire. Si au

contraire et ne tait plus, ou lui donne du lait coupé,
du bouillon, du vin avec de l'eau & lors qu'après
le quatrième ou cinquième jour la fièvre, l'inflammation
et le doleur sont absolument passés, j'en laisse
manger un peu de soupe, de la Bouillie, un oeuf
frais, du pain et du biscuit trempés dans du vin et
de l'eau.

J'abuserais sûrement de vos moments,
Monsieur, si je vous faisais le détail de toutes
les cures que j'ai obtenues, sans que l'on puisse
me citer une seule opération imparfaite; mais
permettez moi de m'arrêter à quelques-unes des plus
difficiles; il n'est pas inutile que je mette à
portée de vérifier ce que j'avance, ceux qui ne
connaissent que l'ancienne méthode, et qui
subjugués par une routine d'infatigable docteur
que votre manière d'opérer méritait autant de lui être
présentée.

L'esprit du nommé Cochoin épicier au fauxbourg
de l'ancienne prieuré Sontoire, avait un bec de lièvre
du côté droit compriqué de la division de la voute du
palais dans toute son étendue; la fente de la levre
se propageait jusqu'au la narine; les bords
étaient adhérents aux bords de la division de la
maxillaire, et l'écartement était assez large
pour qu'on vis l'aillette lors que l'enfant se
présentait devant soi. On me l'apporta
nagant que vingt huit mois; l'on me me
dissimula pour que quelques Chirurgiens de
Sontoire à qui on l'avait fait voir, n'eussent
nié la possibilité de l'opération. Le



L'épauillai, et vis que la cure s'en pouvait
faire. J'opérai en présence de M. Ternuel
Chirurgien à Sontoine, en aide de mon frère
chirurgien à Corneiller en parisis, et en aide de
son élève. Je dissequai et ligurai les adhérences
de droite et de gauche de la division jusqu'à son
l'aile du nez; mon objet fut de la rapprocher plus
près de la cloison et de rendre la narine moins
difforme. La ressection faite, je fis un point
de suture à la partie inférieure de la plaie, et
une suture près de la cloison et de l'aile du nez,
en laissant un petit espace entre les lèvres de cette
même plaie pour l'inflammation qui devait
survenir. J'appliquai mon appareil, j'ôtai
les points de suture le quatrième jour, et au bout
de la huitaine l'enfant se trouva complètement
guéri.

Une fois le docteur parisien à Sontoine avait
une fille âgée de quatre ans affectée d'un bec-de-lièvre
semblable à celui du petit cochon. J'en fis
l'opération au mois de juin dernier, l'enfant
mangea du pain et de la viande le sixième
jour, et on le ramena le huitième si parfaitement
guéri, qu'il est difficile à quatre pas de l'apprehender
qu'il a eu un bec-de-lièvre.

Je terminerai par un dernier exemple: Le
fils d'un nommé Lefevre charon à Sontoine
près la porte d'Emery avait un bec-de-lièvre très
complet et un des plus difficiles que j'aie
encore vus pour obtenir la réunion. Il était

Situé du côté droit, compté de la division de la
voûte du palais dans toute son étendue; la fente de
la levre se prolongeait jusqu'à la narine et
les bords étaient adhérents aux bords de la division
de l'os maxillaire; L'écartement se trouvait tel
qu'il y avait un pouce de la distance de la cloison
à l'aile du nez; La partie du côté gauche de l'os
maxillaire saillait d'un quart de pouce, en sorte
que le bord interne de la division de l'os saillant
était hors du niveau du bord externe de l'os du
côté opposé; les angles de la plaie étaient
très arrondis, ils commençaient près des
commisures des levres, tellement que les
bords ~~se~~ dérivèrent un quart de coudée
depuis la division jusqu'aux commisures des
levres.



On m'apporta ce sujet au mois de juin dernier;
il m'était âgé de vingt-cinq mois. après l'avoir
examiné, ce qui m'embarrassa le plus fut le
défaut de niveau des bords des divisions. Je me
disais, lorsque les levres de la plaie seront
reunies, maintenant par les points de suture,
la levre du côté plus bas formera le point, il y
aura un espace entre elle et la portion de l'os
maxillaire; le Bandage en appuyant dessus
affaissera la levre contre l'os, elle tirera contre les
points de suture occasionnera un déchirement
et la réunion manquera. Je me rappelais, il
est vrai, que par la leçon de M^r. Chopart faisant
le cours d'opération à M^r. Cosme pour M^r. Goursaud,

il nous avoit été indiqué un grand cas, de faire
usage d'une plaque de plomb, pour mettre les parties
de niveau; mais tout considéré j'eus la difficulté
qu'il y aurait de maintenir entre la terre et la machine,
cette plaque de plomb, soit des compresses, et
je pris la résolution d'en agir selon ce que les
circonstances elles mêmes me parurent exiger.

Je fis l'opération, en présence de Mr. Delange
Docteur en médecine, en celle de Mr. Gilbert
Chirurgien de réputation à Jouis-la-Fontaine, et
en celle de mon frère de Cornuilles; j'édouai
et enlevai les adhérences de droite et de gauche;
Je continuai ma dissection jusqu'à ce que la
cloison et l'aile du nez pour que le rapprochement
fut plus facile, et que le nez resta moins difforme.
Je rasurai les bords de la plaie d'une ligne et demie
de chaque côté, je fis un point de suture près des
bords vermineux de la levre, et un second très près
de la cloison et de l'aile du nez. Je ne mis qu'une
petite compresse sur le bord latéral de la plaie
du côté saillant; je n'en mis point du côté opposé,
Il y suppléai par mon coussinet que j'approchai
à peu de distance de la commissure des levres,
de sorte qu'il forma un plan égal avec le côté
saillant. Sur cette dimension le Bandage se
trouva pressé très peu sur la plaie et sur la
levre du côté plus bas. J'enfistois au Sursur
comme à mon ordinaire le baume Blanc du perou.
Le quatrième jour j'ôtai les points de suture,

et je trouvais l'inflammation plus forte que je ne l'avais
encore vue, à cause de la grande dissection à laquelle
j'avais été contraint. La réunion cependant était
complète, et je lavais la plaie et les environs
avec du vin tiède dans lequel j'avais mis un peu
de sulfo-nuère. Je rappliquai mon bandage et
le laissai subsister jusqu'au troisième jour que je
reconnus l'inflammation dissipée; Je fis usage
alors de l'emplâtre de nuremberg jusqu'au
6^e douzième jour que la guérison se trouva ne plus
rien laisser à désirer.

À mon invitation, mon frère qui ne
connaissait que l'ancienne méthode à avoir opéré, avec
surtout par le moyen de la votre, sur des enfants de
trois à quatre ans qui présentés à Mr. Moreau
avaient été renvoyés jusqu'à ce qu'ils fussent
parvenus à un âge plus avancé. Je ne pourrais
pas dans nos environs vous citer d'autres
chirurgiens qui aient fait des cures, car, au
grand désavantage du Subliu, votre manière est
en général aussi peu connue, qu'elle est utile et
infaillible.

La raison est que j'ai vu une infinité de
gens de l'art qui ne connaissent que ce qu'on
leur a enseigné dans leurs cours, et que jusqu'ici
il paraît que la méthode ancienne a continué d'être
la seule qu'on ait indiquée aux Evêques, tandis
qu'il faudrait bien parler que pour en
démontrer les imperfections.

Pour moi qui ai été assez heureux que de



marquer par vos traces, Je me félicite d'avoir
eu amis de confiance en votre méthode pour la
préferer à l'ancienne routine que j'avais
seulement apprise aux écoles. Qu'ils
me suivent & encouragent d'autres que moi à en
obtenir. Qu'ils les fassent et les fassent faire
enfin connaître et adopter universellement une
aussi avantageuse pratique, qui éviterait aux
jeunes et même le désagrement de voir, jusqu'à
dans un âge avancé leurs os se déformer,
et à ceux-ci celui de se voir rebuter des femmes
enchantées qui en appréhendent la vue, et des
enfants même de leur âge à qui il répugne de
les admettre à leur société.

J'ai l'honneur de vous observer encore, Monsieur,
que pour faire les opérations dont j'ai
rendu compte, j'ai trouvé que le bistouri
ordinaire avait la pointe trop longue, comme
il n'y a qu'elle qui agit pour ces opérations.
J'en ai fait faire un épée que j'ai trouvé
plus commode, la lame à vingt deux lignes
de long, la pointe est très courte, en conséquence
la lame est plus large à cet endroit qu'aux
autres bistouris; cette longueur ne donne
la facilité de mettre le doigt index près de la
pointe, ou le dos est presque aussi large qu'à
l'origine de la lame; Par ce moyen la
pression est directe sur l'endroit
coupant et sur le carton qui sert de

promis d'appui sous la bannière de la division,
pour faciliter le rattachement.

Je suis avec respect,

Mesnager,

Votre très humble
et très obéissant serviteur

Lobeaux

chirurgien à Coustans-
- St Honorine, près
Soutoise



